



COME EFFETTUARE LA CORRETTA RACCOLTA E SOMMINISTRAZIONE DEL COLOSTRO

PRIMA FASE RACCOLTA E PASTORIZZAZIONE



1. Mungere la bovina subito dopo il parto. Prestare particolare attenzione e applicare le migliori pratiche igieniche, mungitura dopo 60 giorni di asciutta.





2. Misurare la qualità del colostro con rifrattometro digitale o colostrometro
Livello soglia >22 Brix → ottimo Livello soglia <22 Brix → scarso



3. Registrare i dati sulla busta e nel pc aziendale.
4. Travasare il colostro nelle buste Perfect Udder® e preparare al trattamento termico per ottenere un colostro più salubre riducendo la carica batterica

5. Immergere le buste nel pastorizzatore Matilda e avviare il programma pastorizzazione (60°C per 60 minuti). Attendere il termine del ciclo (scambio termico acqua calda-acqua fredda)



6. Estrarre le buste (ulteriore abbattimento in acqua fredda) e riporle in congelatore. Se utilizzato entro 5/6 gg conservare in frigorifero.

SECONDA FASE SOMMINISTRAZIONE

1. Avviare il pastorizzatore-scongelatore Matilda sul programma riscaldamento
2. Immergere le buste congelate ed attendere la fine del ciclo di riscaldamento. Al termine il colostro arriverà ad una temperatura di somministrazione di 37°- 40°C.



3. Applicare la tettarella o la sonda e somministrare l'intera busta

Sonda bianca per vitelli > 30 kg

Sonda arancione per vitelli < 30 kg o parti gemellari



NB ATTENZIONE Effettuare la prima somministrazione di colostro il prima possibile:

- Il primo pasto entro 1 ora dalla nascita (4 lt)
- Il secondo pasto dopo 8/10 ore dalla nascita (2 lt) con le stesse modalità
- Se gemellare (3lt + 2lt)

